

### ث ( عوارض جانبی):

به صورت نادر موارد زیر گزارش شده است: سرگیجه، سردرد، بی خوابی، بی اشتها و کاهش نبض.

### ج ( مسمومیت دارویی):

از نظر تئوری در مصرف بیش از اندازه دارو تحریک پذیری سیستم عصبی قابل پیش بینی است. آنتی دوت مشخصی شناخته نشده است.

### چ ( شرایط نگهداری دارو):

دارو را دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

### ح ( بسته بندی):

شركت داروسازی رها میورین را با نام تجاری کولومب® به صورت قرص ۱۳۵ میلی گرمی و کیسول پیوسته رهش ۲۰۰ میلی گرمی، در بلیستر و درون جعبه، به همراه بروشور عرضه می نماید.

2

# Colomeb®

## Mebeverine

# کولومب®

## میورین

شکل دارویی: قرص ۱۳۵ میلی گرم و کیسول پیوسته رهش ۲۰۰ میلی گرم

دسته دارویی: آنتی کولینرژیک - داروهای گوارشی

موارد مصرف و آثار درمانی:

ضد اسپاسم، درمان علامتی درد و گرفتگی عضلات شکمی، سندرم روده تحریک پذیر یا IBS، درمان کمکی در اختلالات گوارشی.

### الف ( راهنمایی های عمومی):

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید:

• در صورت حساسیت به این دارو یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده دارو یا سابقه حساسیت به داروهای دیگر.

• در صورت ابتلا به نارسایی کبدی، نارسایی کلیوی، اختلالات قلبی، آرتزین قلبی، پورفیریا، سبستیک فیبروزیز و عدم تحمل لاکتوز.

### ب ( مصرف در دوران بارداری و شیردهی):

اطلاعاتی در رابطه با میورین هیدروکلراید در دوران بارداری وجود ندارد. بهتر است پزشک معالج با توجه به منافع و مضرات، دارو را تجویز نماید. این دارو به مقدار کم در شیر ترشح میشود.

### پ ( هشدارها):

• در صورت ابتلا به انسداد روده یا فلج روده (Paralysis ileus) از مصرف این دارو خودداری کنید.

• از کار یا ماشین آلات و وسایلی که احتیاج به دقت دارند، خودداری شود.

• از رانندگی پرهیز گردد.

### ت ( مقدار و نحوه مصرف دارو):

مقدار و دوز مصرف را پزشک تعیین میکند.

مقدار مصرف معمول دارو در بزرگسالان:

یک قرص ۱۳۵ میلی گرمی کولومب® ۳ بار در روز قبل از غذا.

۱ کیسول ۲۰۰ میلی گرمی کولومب® ۲ بار در روز قبل از غذا.

مقدار مصرف معمول دارو در کودکان بر طبق BNFC سه بار در روز، ۲۰ دقیقه قبل از غذا و به صورت زیر میباشد.

۳ تا ۴ سال: ۲۵ میلی گرم

۴ تا ۸ سال: ۵۰ میلی گرم

۸ تا ۱۰ سال: ۱۰۰ میلی گرم

۱۰ تا ۱۸ سال: همانند بزرگسالان

1