

۶- در صورت فراموشی یک دوز دارو، از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری کنید.

۷- قرص را بطور کامل بلعیده و از خرد کردن و یا جویدن آن خودداری نمایند.

۸- به دلیل ایجاد افزایش حساسیت به نور خورشید، بدون ضد آفتاب در معرض نور خورشید قرار نگیرید.

**(ث) مقدار و نحوه مصرف دارو :**

میزان مصرف این دارو را پر شک معلاج تعیین می کند. دارو را همراه با غذا مصرف نمایید.

**(ج) عوارض جانبی:**

هر دارو به مواد اثرات درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز عوارض تاخوسته ای نیز شود. اگر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز هر یک از آنها با پر شک خود مشورت کنید.

شایعترین : بی حالی ، خستگی ، تهوع ، استفراغ ، گیجی ، بی قراری ، دردهای غیر عادی نورالزیک

مهمنترین : آنتی آپلاستیک ، اگرانولوستیز ، کاهش موقت یا دائمی پلاکت یا شمارش گلبولهای سفید خون

سایر عوارض : سمیت CNS ، تاری دید ، دوبینی ، نیستاموس ، کدورت نقطه ای فقر عدنسی

عوارض نادر : واکنشهای آلرژیک ، سندروم استیون - جاسون ، تکروز سمی ایدرم ، اضطراب ، آنکسی ، تغییرات رفتاری در کودکان ، درد قفسه سینه ،

قدمان حس شخصیت ، اسهال ، علامت اکستراپیرامیدال ، هیپو تانرمی ، مسمومیت با آب ، غونت ، افسردگی همراه با ایزیتاپسیون (اشتگی) ، تمایل به

خود کشی ، سندروم شبه لوپوس اریتماتوز ، منزتیت آسپتیک همراه با موکلونوس

**(ج) امسوومیت دارویی:**

در صورت مصرف دارو بیش از مقدار تجویز شده بیمار را به بیمارستان منتقل نمایید.

**(ح) انداملاط دارویی :**

❖ قبل از مصرف دارو، پر شک یا دارو ساز خود را از مصرف هرگونه دارو مطلع سازید.

❖ بسیاری از داروها با مصرف کاریامازین دچار کاهش یا افزایش غلظت پلاسمایی می شوند. در لیست زیر به اختصار نام برخی از داروها که ایجاد تداخل ممکنند، آورده شده است:

توفیلین، داروهای ضد بارداری و داروهای هورمونی، برخی آنتی بیوتیک ها از جمله ماقولهایدا، داروهای ضد قارچ مثل فلوكوتاژول و کتوکوتاژول، وارفارین،

داروهای ضد سرطان از جمله میس بلاتین و ... داروهای ضد فشار خون مثل دلتیازم و ... داروهای بیوندی مثل پردنیزولون و تاکرولیموس، سیکلوسپورین

وغیره، داروهای استروئیدی از جمله دگزا متازون و ... داروهای جایگزین تیروئید از جمله لووئبروکسین.

❖ برای اطلاع دقیق از نوع تداخل و شدت تداخل با پر شک مشورت نمایید. در برخی موارد با تنظیم دوز و صلاحید پر شک معلاج، مصرف همزمان مشکلی ندارد.

**(خ) اشراط تکدداری دارو :**

دارو را از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کرده و از بخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

**(د) ایسته بندی :**

شرکت داروسازی راه کاریامازین را با نام تجاری تگاتارد<sup>®</sup> ۲۰۰، به صورت قرص بپوسته رهش، درون جعبه به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه میکند.

# Tegatard<sup>®</sup> 200

## Carbamazepine

تگاتارد<sup>®</sup> ۲۰۰

کاریامازین

شکل دارویی: قرص بپوسته رهش

دسته دارویی: ضد تشنج، ضد دردهای نوروپاتی

**(الف) موارد مصرف و آثار درمانی:**

صرع کمپلکس پارشیال، تونیک کلونیک، صرع های میکس، نورالزی عصب سه قلو، موارد ثبت نشده در اختلالات مانیا و اسکیزوفرنی، ضد تشنج،

آنی دیورتیک، آنتی مانیک، آنتی سایکوتیک، ضد نورالزی.

**(ب) راهنمایی های عمومی:**

این دارو برای بیماری فعلی تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پر شک یا دارو ساز خود مشورت کنید:

-۱- در صورت حساسیت به این دارو یا هر کی از اجزای تشکیل دهنده آن.

-۲- در صورت حساسیت به فنی توتین، فنورپیتان، پریمیدون، اکس کاریامازین

-۳- در صورت سایه ساقه داشتن انواع دیگر صرع (ایسنس و آتونیک)

-۴- در صورت سایه افزایش فشار جسم (گلوکوم)

-۵- در صورت سایه اختلالات کلیوی و کبدی، رفتاری و ذهنی، افکار خودکشی با MS.

-۶- در صورت سایه اختلالات خونی و احتلال قلبی و یا کبدی در اثر مصرف داروهای دیگر

-۷- در صورت سایه زنیکی وجود یا عدم وجود HLA-B1502

-۸- در صورت سایه مصرف کاریامازین

**(پ) مصرف در دوران بارداری و شیردهی:**

این دارو در گروه D از FDA قرار دارد. در صورت نیاز به مصرف، فواید و مضرات دارو باید توسط پر شک بررسی و مقایسه گردد. کاریامازین در شیر نیز ترشی می شود.

**(ت) هشدارها:**

-۱- جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو، حتماً با پر شک خود مشورت نمایید.

-۲- از قطع ناگهانی و کاهش دوز دارو خودداری کنید.

-۳- این دارو ممکن است باعث ایجاد خواب آلودگی گردد، لذا ضمن درمان از راندگی و کارهایی که نیازمند هوشیاری کامل است احتیاط نمایید.

-۴- از نوشیدن الکل و سایر نوشیدنی ها و داروهای الکل دار و سایر داروهای تضعیف کننده مغز و اعصاب احتیاط کنید.

-۵- در طول مدت مصرف این دارو، آب گزیب فروت نوشید.