

# Angipol<sup>®</sup> ER

## Metoprolol Succinate

## آنژیپول<sup>®</sup> پیوسته رهش

متوپرولول سوکسینات

**شکل دارویی:** قرص ۴۷/۵ میلی گرم پیوسته رهش (معادل ۵۰ میلی گرم متوپرولول تارتارات)

**دسته درمانی:** بتا بلاکر

**اثر درمانی:** متوپرولول در درمان آئزین صدی مزمن کنترل فشارخون (به تنهایی یا همراه با سایر داروهای کاهنده فشار خون)، پیشگیری از انفارکتوس مجدد میوکارد، بـرای حفاظت از قلب، پیشگیری از سردردهای میگرنی و مشکلات تیروئیدی مصرف میشود.

**الف) راهتمایبهای عمومی:**

این دارو برای بیماری قلبی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکسترساروساز مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا دیگر داروهای بتا بلاکر مثل آنتیولول، لابتالول، کارودیلول، سوتالول، پروپرانولول، ناپولول و نیبولول.
- در صورت نیاز به مصرف سایر داروها از داروساز یا پزشک درمورد تداخل با متوپرولول سوال کنید؛ متوپرولول با داروهای زیر تداخل دارد:
- بوبروپین، پرازوسین، ترتینافین، کلومیپرامین، دسپیرامین، دولوکستین، فلوکستین، پاروکستین، سرتالین، ارگونوپین، ارگونامین، متیل ارگونوپین، آملودیپسین، کلونیدین، دیگوکسین، دلیتامز، دی پیریدامول، هیدرالازین، متیل دوبا، نینیدین، فنلژین، راسائزین، وریابامیل، کینتیدین، لینولین، ترانیل سیپرومین، ایزوکربوکازید، کلروپرومازید، فلوئنازین، هالوپریدول، تیوریدازین
- بارداری یا دوران شیردهی.
- مشکلات کبدی و یا کلیوی
- فشار خون پایین یا مشکلات مربوط به گردش خون.
- آسم و سایر مشکلات تنفسی، تنگی نفس و COPD
- بیماری های تیروئیدی.
- پسروریزیس (نوعی مشکل پوستی).
- میاستنی گراویس (نوعی بیماری است که موجب ضعف عضلات می شود).
- نارسای قلبی (شرایطی که پمپاژ قلب کاهش یافته است و یا ضربان قلب ضعیف و نامنظم است) و نارسای احتقانی قلب.
- آئزین پرینماتوزال (ورایات): نوعی درد قفسه سینه میباشد که علت آن اسپاسم عروق خون رسان به قلب می باشد.
- فنوکروموسانتوما (تومور غده آدرنال)
- مصرف سایر داروها (حتی داروهای گیاهی)
- سابقه حساسیت دارویی یا هرگونه سابقه حساسیتی شدید
- رعایت رژیم غذایی توصیه شده توسط پزشک، بسیار حائز اهمیت میباشد.
- توصیه میشود در طول مدتی که متوپرولول استفاده میکنید از نوشیدن الکل خودداری نمایید، زیرا الکل میتواند موجب بروز برخی از عوارض جانبی گردد.
- در صورتیکه دیابت دارید به طور مرتب قند خون خود را چک کنید، زیرا این دارو میتواند بر سطح قند خون تأثیر بگذارد. همچنین ممکن است علامت ناشی از افت قند خون را ببوشاند.
- اگر هرگونه جراحی دندان دارید، دندانپزشک خود را از مصرف متوپرولول مطلع سازید.
- مصرف دارو را بدون تجویز پزشک قطع نکنید. قطع ناگهانی دارو میتواند موجب بروز مشکلاتی گردد، لذا در صورت نیاز، پزشک به صورت تدریجی دوز دارو را کاهش میدهد.
- سعی کنید به طور مرتب به پزشک مراجعه نمایید، زیرا در این صورت روند درمان بهتر کنترل میشود.

**ب) مصرف در دوران بارداری و شیردهی:**

جزء گروه C است و ممکن است به جنین آسیب برساند. در صورت شک به بارداری یا تصمیم بارداری، پزشک خود را مطلع سازید. متوپرولول از عبور غیر می کند و شاید به نوزاد آسیب برساند، برای جلوگیری از آسیب احتمالی حتما با پزشک خود مشورت نمایید.

**پ) هشدارها**

• جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو حتما به پزشک خود مراجعه کنید. دارو را بیشتر یا کمتر از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف ننمایید و از قطع خودسرانه مصرف دارو خودداری کنید. به منظور بررسی پیشرفت درمان به طور منظم به پزشک مراجعه کنید.

• مصرف این دارو در بیماران پایین تر از ۱۸ سال ممنوع است.

• مصرف این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان صورت گیرد؛ سابقه لرزی، آسم نایزهای، آمفیژم یا برونشیت غیر آلرژیک، نارسای احتقانی قلب، دیابت، برکساری تیروئید، افسردگی روانی یا سابقه ابتلا به آن.

• مقدار مصرف این دارو در سالمندان باید بر اساس پاسخ بیمار تعیین شود. زیرا از یک طرف به علت کاهش حساسیت این بیماران به اثر دارو ممکن است افزایش مقـسـدار مصرف لازم باشد و از طرف دیگر به علت کاهش توانایی متابولیسم و دفع دارو، کاهش مقدار مصرف ممکن است ضرورت یابد.

• در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه، مقادیر مصرف متوپرولول باید کاهش یابد.

• درصورت بروز افسردگی ناشی از این دارو، مصرف آن باید قطع شود.

• اگر بعد از یک دوره درمان طولانی با این دارو قطع مصرف آن ضرورت پیدا کند، باید به تدریج و حداقل طی سه روز تا دو هفته مصرف دارو قطع شود. در طول این مدت، بیمار باید از فعالیتهای شدید بدنی پرهیز کند تا خطر بروز انفارکتوس میوکارد یا آرشمی به حداقل برسد. اگر پس از قطع مصرف دارو، علائم قطع مصرف بروز کرد، باید مصرف دارو را به طور موقت مجدداً شروع نمود و به دنبال بهبود بیمار، مصرف دارو را با احتیاط قطع کرد.

• در طول مصرف این دارو، پیگیری عملکرد قلب، تعیین نبض، اندازه گیری فشار خون و ثبت نوار قلبی و اندازه گیری ضربان قلب ضروری است.

• این دارو در شوک قلبی، نارسای آشکار قلب، بلوک قلبی درجه دو یا سه دهلیزی - بطنی، برای کاردی ستنوسی و کاهش فشار خون سیستولیک به کمتر از ۱۰۰ میلیمتر جیوه (برای پیشگیری از انفارکتوس مجدد میوکارد) نباید مصرف شود.

• هیچ یک از نوبتهای مصرف این دارو نباید فراموش شود، به خصوص اگر روزی یک بار مصرف میشود.

• این دارو، فشار خون بالا را درمان نمیکند، بلکه آن را کنترل مینماید. مصرف آن ممکن است تا پایان عمر ضروری باشد.

• مصرف دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد.

• در بیماران مبتلا به دیابت، با مصرف این دارو ممکن است علائم کاهش قند خون پوشانده شده یا طولانی شود، و یا غلظت قند خون افزایش یابد.

• در مصرف این دارو یا سایر داروها، به ویژه داروهای مقصد سمیاتی که نیاز به نسخه پزشک ندارند، باید خودداری شود.

• قبل از قطع مصرف دارو، باید با پزشک مشورت شود.

• تا زمانی که بیمار به پاسخ درمانی دارو عادت نکرده است، از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد اجتناب گردد.

### ت) عوارض جانبی:

این دارو به موارات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند.

برای کاردی علامتی، سرگیجه، اسپاسم بروش، اشکال در تنفس یا خـس خـس سینه، نارسای احتقانی قلب، تورم مچ پا و اندامهای تحتانی، تنگی نفس، افسردگی روانی و کاهش گردش خون محیطی، سردی دستها و پاها و کاهش میل جنسی با مصرف این دارو گزارش شده است.

### ث) مقدار و نحوه مصرف دارو:

• دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.

• برای اینکه مصرف دارو فراموش نشود سعی کنید دارو را در زمانهای مشخص مصرف کنید.

• در صورت فراموش کردن یک دوز دارو، به محض به یادآوردن آن را مصرف کنید مگر اینکه نوبت بعدی مصرف دارو نزدیک باشد. در ایـسن صورت از دو برابر کسردن دوز بعدی خودداری نمایید.

• فرص را بطور کامل بلعیده و از جویدن، خرد کردن یا نصف کردن آن خودداری ننمایند.

• دارو را همراه یا بعد از غذا میل کنید.

### ج) مسمومیت دارو:

اگر بیش از مقدار تجویز شده این دارو را مصرف کرده اید، فوراً به بیمارستان مراجعه کنید. افت شدید فشار خون، ضربان کند، مشکلات قلبی، مشکل در هدایت الکتریکی قلب، تنگی نفس، آبی شدن پوست، افت قند خون، سطح بالای پتاسیم در خون، بیهوشی و کما از نشانه های مصرف دوزهای بیش از اندازه است.

### چ) شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، در ظروف در بسته نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

### ح) بسته بندی:

شرکت داروسازی رها قرص پیوسته رهش متوپرولول سوکسینات را با نام تجاری آنژیپول<sup>®</sup> در بلیستر به همراه بروشور و درون جعبه بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.

• هر قرص متوپرولول سوکسینات ۴۷/۵ حاوی ۲۷/۵ میلیگرم متوپرولول سوکسینات معادل ۵۰ میلیگرم متوپرولول تارتارات است.