

ت (عوارض جانبی):

این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند.
خواب آلودگی، سرگیجه، احساس سبکی در سر، اختلالات بینائی (دوبینی)، افت فشار خون و بی خوابی، ورم، درد عضلانی یا مفصلی، منگی، تکرر ادرار، عفونت ادرار، سوءظن، تهوع، توهم خصوصاً در افراد مسن، تب، پنومونی، درد قفسه سینه، بلع دردناک، فراموشی.

ث (مقدار و نحوه مصرف دارو):

- ❖ مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند.
- ❖ به منظور کاهش عوارض جانبی دارو و پیشگیری از افت فشار خون وضعیتی شروع درمان از زیر حد دوز درمانی شروع میشود و سپس دوز دارو به تدریج در طی چند روز افزایش یابد.
- ❖ این دارو را کمتر یا بیشتر از دوز تعیین شده مصرف نکنید.
- ❖ کودکان: ایمنی و کارائی این دارو در کودکان زیر ۱۲ سال ثابت نشده است.
- ❖ این دارو در ۲ دوز منقسم مصرف می گردد.

ج (مسمومیت دارویی):

فوراً بیمار را به بیمارستان منتقل کنید.

چ (شرایط نگهداری دارو):

دارو را دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

د (بسته بندی):

شرکت داروسازی رها پرامی پکسول را با نام تجاری پارکیسول® ۰/۱۸ به شکل قرص بصورت پلیستر درون جعبه به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه میکند.
هر قرص پارکیسول® ۰/۱۸ حاوی ۰/۱۸ میلی گرم پرامی پکسول ویا ۰/۲۵ میلی گرم پرامی پکسول دی هیدروکلراید می باشد.

Parkisol® 0.18 Pramipexole

پارکیسول® ۰/۱۸ پرامی پکسول

شکل دارویی : قرص خط دار
دسته دارویی : آگونیست دوپامین (ضد دیسکینزی)

موارد مصرف و آثار درمانی :

پارکینسون، سندروم پای بی قرار
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

الف (راهنمایی های عمومی):

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- ۱- در صورت سابقه حساسیت به این دارو
- ۲- در صورت مصرف هر نوع دارو خصوصاً :
 - ترکیبات لوودوپا و کربی دوپا
 - سایمیتیدین
 - انتاگونست دوپامین مانند هالوپریدول، متوکلوپرامید، فنوتیازینها و تیوگزانتینها
 - داروهای که دفع کلیوی دارند مانند دپلتیازم، کینیدین، کینین، رانیپیدین، وراپامیل، تریامترن.
 - ۳- در صورت ابتلا به بیماریهای کلیوی (نارسائی کلیه)، بیماریهای دژنراتیو شبکه چشم، عوارض فیبروتیک ناشی از داروهای دوپامینرژیک .

ب (مصرف در دوران بارداری و شیر دهی):

این دارو در گروه C از طبقه بندی FDA قرار دارد. مصرف این دارو در دوران بارداری و شیر دهی بایستی در موارد اضطراری و با تشخیص پزشک انجام شود.

پ (هشدارها):

- جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو حتماً به پزشک خود مراجعه کنید.
- مصرف این دارو ممکن است سبب سرگیجه، مشکلات بینایی، ضعف، احساس سبکی سر و عدم هماهنگی در ماهیچه ها شود، لذا از رانندگی و کارهایی که نیاز به هوشیاری و دقت کافی دارند خودداری کنید.
- مصرف این دارو در بیماران مسن که مستعد بیماریهای کلیوی هستند، با احتیاط صورت گیرد.
- ایمنی و کارائی این دارو در کودکان ثابت نشده است. لذا نباید در گروه سنی زیر ۱۲ سال مصرف شود.
- در صورتیکه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض بیدار آوردن در صورتیکه نزدیک مصرف دوز بعدی نباشد آن را میل کرده و از دو برابر کردن مقدار مصرف خودداری کنید.