

ت) مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معالج تعیین می نماید . مقدار معمول مصرف این دارو به شرح زیر می باشد:

❖ کودکان ۱۲ تا ۱۷ سال روزانه یک قرص ، برای درمان کوتاه مدت تا حداکثر ۸ هفته .

❖ بالغین روزانه ۱ یا ۲ قرص برای مدت ۴ تا ۸ هفته .

❖ دارو را حداقل یک ساعت قبل از وعده غذایی مصرف نمایید تا اثر بخشی بهتری داشته باشد .

ج) عوارض جانبی:

عوارض شایع: سردرد، درد شکمی، یبوست، اسهال، نفخ، تهوع و استفراغ، پولیپ غدد قاندریک.

عوارض غیر شایع: ادم محیطی، بی خوابی ، گیجی ، خواب آلودگی، بی حسی، سرگیجه، خشکی دهان، افزایش آنزیم کبدی، درمانیت، خارش، راش، کهیر، شکستگی استخوان ران، مع دست و ستون فقرات.

عوارض با احتمال بسیار کم: لوکوپنی، ترومبوسیتوپنی، آگرانولوسیتوز، بان سیتوپنی، واکنش های حساسیتی، هایپوناترمی، هایپو منیزمی، هایپو کالمی، بی قراری، افسردگی، توهم، تغییر در طعم دهان، تاری دید، برونکواسپاسم ، التهاب معده، کاندیدیازیس گوارشی، کولیت، هپاتیت، تارسای کبدی، انسفالوپاتی (در بیماران با سابقه قبلی بیماری کبدی)، الوپسی، حساسیت به نور، آرترا لژی، میالژی، اریتما، استیون- جانسون، نکروز اپیدرمال توکسیک، لوپوس اریتماتوز، ضعف عضلانی، ژینکوماستی، افزایش تعریق، بی حالی.

چ) مسمومیت دارویی :

احتمال مسمومیت با این دارو بسیار کم است . در موارد نادر بیمار را به اورژانس مسمومین منتقل کنید .

ح) شرایط نگهداری دارو :

این فرآورده را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید .
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

خ) بسته بندی :

شرکت داروسازی رها ، قرص اس امپرازول ۲۰ میلی گرمی اتریک کوند را با نام تجاری راکسوم® در پلیستر و درون جعبه به همراه بروشور به بازار عرضه می کند .

2

TAB.BOX.RXM20/061.05

Raxum® 20

Esomeperazole

راکسوم® ۲۰
اس امپرازول

شکل دارویی : قرص اتریک کوند ۲۰ میلی گرمی

دسته دارویی : مهار کننده ترشح پمپ پروتونی ، مهار کننده ترشح اسید معده ، ضد زخم معده .

الف) موارد مصرف :

داروها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک شما در تجویز این دارو در این بروشور ذکر نشده باشد .
به طور عمومی موارد مصرف این دارو شامل موارد زیر می باشد :

اس امپرازول ایزومر S (چپ گرد) از امپرازول (مهار کننده پمپ پروتونی معده) می باشد و به طور مشابه در درمان بیماری زخم معده و رفلاکس گوارشی کاربرد دارد .

این دارو در سندرم زولینگر - الیسن و زخم معده شدید همراه خونریزی ، نیز تجویز می شود و برای ریشه کنی هلیکوباکتریلوری به صورت ترکیبی در کنار کلاریترومایسین، اموکسی سیلین یا مترونیدازول، و همچنین در کاهش ریسک زخم معده در اثر مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، نیز تجویز می شود.

ب) راهنماییهای عمومی :

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید :

۱- در صورت سابقه حساسیت به این دارو .

۲- در صورت بروز سوء هاضمه، اسهال و کهیر در طی درمان .

پ) مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :

این دارو در گروه C، ازطبقه بندی FDA قرار دارد، مطالعات کافی روی انسان انجام نشده است. لذا مصرف این دارو با نظر پزشک و پس از مقایسه منافع دارو نسبت به مضرات آن، انجام گردد.

ت) هشدارها :

❖ این دارو باید در بیماران مبتلا یا دارای سابقه ابتلا به بیماری مزمن کبدی با احتیاط مصرف گردد .

❖ مهار کننده های پمپ های پروتونی به دلیل کاهش اسید معده، باعث کاهش جذب بسیاری از داروهای دیگر می شوند. برای جذب بهتر و موثر داروهای دیگر با دکتر داروساز خود مشورت کنید .

1