

- ۶- در صورت فراموشی یک دوز دارو، از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری کنید.
- ۷- قرص را بطور کامل بلعیده و از خورد کردن و یا جویدن آن خودداری نکنید.
- ۸- به دلیل ایجاد افزایش حساسیت به نور خورشید، بدون ضد آفتاب در معرض نور خورشید قرار نگیرید.

**ت) مقدار و نحوه مصرف دارو :**

میزان مصرف این دارو را پزشک معالج تعیین می کند. دارو را همراه با غذا مصرف نمایید.

**ج) عوارض جانبی:**

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای نیز بشود. اگر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید:

شایعترین: بی حالی، خستگی، تهوع، استفراغ، گیجی، بی قراری، دردهای غیر عادی نورالژیک  
مهمترین: انمی آپلاستیک، آگرانولوسیتوز، کاهش موقت یا دائمی پلاکت یا شمارش گلبولهای سفید خون

سایر عوارض: سمیت CNS، تاری دید، دوبینی، نیستگاموس، کدورت نقطه ای قشر عدسی

عوارض نادر: واکنشهای آلرژیک، سندرم استیون-جانسون، نکروز سمی ایدرم، اضطراب، آتاکسی، تغییرات رفتاری در کودکان، درد قفسه سینه، فقدان حس شخصیت، اسهال، علائم اکسترپیرامیدال، هیپوناترمی، مسمومیت با آب، عفونت، افسردگی همراه با ازیئاسیون(آشفتگی)، تمایل به

خودکشی، سندرم شبه لوپوس اریتماتوز، مننژیت آسپتیک همراه با میکوکولوس

**ح) مسمومیت دارویی:**

در صورت مصرف دارو بیش از مقدار تجویز شده بیمار را به بیمارستان منتقل نمایید.

**ج) تداخلات دارویی:**

❖ قبل از مصرف دارو، پزشک یا دارو ساز خود را از مصرف هرگونه دارو مطلع سازند.

❖ بسیاری از داروها با مصرف کاربامازپین دچار کاهش یا افزایش غلظت پلاسما می شوند. در لیست زیر به اختصار نام برخی از داروها که ایجاد تداخل میکنند، آورده شده است:

توفیلین، داروهای ضد بارداری و داروهای هورمونی، برخی آنتی بیوتیک ها از جمله ماکرولیدها، داروهای ضد قارچ مثل فلوکنازول و کتوکنازول، وارفارین، داروهای ضد سرطان از جمله سیس پلاتین و...، داروهای ضد فشار خون مثل دیلتیازم و...، داروهای پیوندی مثل پردنیزولون و تاکرولیموس، سیکلوسپورین و غیره، داروهای استروئیدی از جمله دکزا متازون و...، داروهای جایگزین تیروئید از جمله لووتیروکسین.

❖ برای اطلاع دقیق از نوع تداخل و شدت تداخل با پزشک مشورت نمایید. در برخی موارد با تنظیم دوز و صلاحدید پزشک معالج، مصرف همزمان مشکلی ندارد.

**خ) شرایط نگهداری دارو:**

دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کرده و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

**د) بسته بندی:**

شرکت داروسازی رها کاربامازپین را با نام تجاری تگاتارد<sup>®</sup> ۴۰۰، به صورت قرص پیوسته رهش، درون جعبه به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه میکند.

# Tegatard<sup>®</sup> 400

## Carbamazepine

## تگاتارد<sup>®</sup> ۴۰۰

کاربامازپین

**شکل دارویی:** قرص پیوسته رهش

**دسته دارویی:** ضد تشنج، ضد دردهای نورویاتی

**الف) موارد مصرف و آثار درمانی:**

صرع کمپلکس پارشیال، تونیک کلونیک، صرع های میکس، نورالژی عصب سه قلو، موارد تثبیت نشده در اختلالات مانیا و اسکیزوفرنی، ضد تشنج، آنتی دیورتیک، آنتی مائیک، آنتی سایکوتیک، ضد نورالژی.

**ب) راهنمایی های عمومی:**

این دارو برای بیماری فعلی تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

۱- در صورت حساسیت به این دارو یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده آن.

۲- در صورت حساسیت به فنی توشین، فنوباریتال، پریمیدون، اکس کاربازپین

۳- در صورت سابقه داشتن انواع دیگر صرع (بسنس و اتونیک)

۴- در صورت سابقه افزایش فشار چشم (گلوکوم)

۵- در صورت سابقه اختلالات کلیوی و کبدی، رفتاری و ذهنی، افکار خودکشی یا MS.

۶- در صورت سابقه اختلالات خونی و اختلال قلبی و یا کبدی در اثر مصرف داروهای دیگر.

۷- در صورت سابقه زنتیکی وجود یا عدم وجود HLA-B1502

۸- در صورت سابقه مصرف کاربامازپین

**پ) مصرف در دوران بارداری و شیر دهی:**

این دارو در گروه D از FDA قرار دارد. در صورت نیاز به مصرف، فواید و مضرات دارو باید توسط پزشک بررسی و مقایسه گردد. کاربامازپین در شیر نیز ترشح می شود.

**ت) هشدارها:**

۱- جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو، حتما با پزشک خود مشورت نمایید.

۲- از قطع ناگهانی و کاهش دوز دارو خودداری کنید.

۳- این دارو ممکن است باعث ایجاد خواب آلودگی گردد، لذا ضمن درمان از رانندگی و کارهایی که نیازمند هوشیاری کامل است اجتناب نمایید.

۴- از نوشیدن الکل و سایر نوشیدنی ها و داروهای الکل دار و سایر داروهای تضعیف کننده مغز و اعصاب اجتناب کنید.

۵- در طول مدت مصرف این دارو، آب گریپ فروت ننوشید.