

**عوارض گوارشی:** درد شدید معده ، سوزش سر دل ، اسهال ، مدفوع سیاه رنگ یا قیری ، احساس تجمع گاز در شکم.

**عوارض کلیوی:** دفع مشکل ادرار ، تکرر ادرار ، ادرار خونی.

**عوارض عصبی:** خواب آلودگی ، گیجی ، عصبانیت.

واکنش های حساسیتی: کهیر ، خس خس سینه ، خارش پوست ، تنگی نفس.

**عوارض خونی:** کم خونی ، کمی پلاکتهای خون ، ضربان غیر عادی قلب.

**مقدار و نحوه مصرف دارو :**

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند و باید دقیقاً از آن پیروی کرد. مقدار مصرف معمول این دارو به نوع بیماری بستگی دارد:

مقدار مصرف در درمان آرتریت روماتوئید ۱۰۰-۷۵ میلی گرم در روز می باشد.

**مسمومیت دارویی :**

در صورت مصرف بیش از مقدار تجویز شده بیمار را وادار به استفراغ کرده و هر چه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

**شرایط نگهداری دارو :**

دارو را دور از رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

**بسته بندی :**

شرکت داروسازی رها قرص دیکلوفناک ۵۰ را با نام تجاری ولدیک® در بلیستر و به همراه برگه راهنما و درون جعبه بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.

هر قرص حاوی ۵۰ میلی گرم دیکلوفناک سدیم می باشد.

## Voldic® 50

Diclofenac Sodium

## ولدیک® ۵۰

دیکلوفناک سدیم

**شکل دارویی :** قرص آنتریک کوتد ۵۰ میلی گرم

**دسته درمانی :** ضد التهاب غیر استروئیدی

**اثر درمانی :**

\* مسکن و ضد التهاب

**راهنمایی های عمومی :**

قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

۱- در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو ، غذا ، ماده رنگی یا ماده محافظ

۲- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر: اختلالات خونی ، آسم ، کولیت ، نارسایی کلیه ، کبد ، کم خونی ، تپش قلب ، فشارخون ، پورفیریا ، ورم قوزک پا ، کهیر

۳- در صورت مصرف هرگونه دارو از جمله سایتمیدین ، سالیسیلاتها ، داروهای ضد انعقاد ، داروهای ضد فشارخون ، داروهای ضد صرع ، سیکلوسپورین ،

پنی سیلایم ، متوترکسات ، داروهای ضد دیابت و انسولین.

**مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :**

این دارو در دوران بارداری و شیردهی به هیچ وجه بدون صلاحدید پزشک مصرف نشود.

**هشدارها**

۱- در صورت بروز اسهال ، مصرف دارو را قطع کنید و با پزشک خود مشورت کنید

۲- در صورت قرار گرفتن در معرض نور آفتاب ، احتمال آفتاب سوختگی شدید ، خارش و راش پوستی وجود دارد ، بنابراین این در معرض آفتاب مستقیم قرار نگیرید. از لباس های محافظ ، کلاه ، عینک و ضد آفتاب استفاده کنید.

۳- بیماری که نسبت به اسید استیل سالیسیلیک (مانند آسپرین) یا سایر داروهای ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی عدم تحمل نشان می دهند

ممکن است دیکلوفناک را تحمل نکنند. در صورت بروز واکنش های آلرژی که با علائم تنفس نامنظم ، نبض نامنظم ، تورم و تغییر رنگ صورت به پزشک

خود مراجعه کنید.

۴- دیکلوفناک ترجیحاً پس از غذا یا همراه غذا یا با داروهای ضد اسید معده مصرف شود تا تحریک گوارشی کاهش یابد.

۵- توصیه می شود این دارو همراه یک لیوان آب مصرف شود و بمدت ۳۰-۱۵ دقیقه پس از مصرف دارو دراز نکشید.

۶- در صورت مصرف دیکلوفناک بدون دستور پزشک از مصرف طولانی مدت آن خودداری کنید.

۷- در صورت بروز دل درد شدید ، مدفوع قیری ، تهوع شدید ، سوزش سر دل ، سوء هاضمه ، استفراغ خونی یا اجسام شبیه به دانه های قهوه ای ، مصرف دارو

را قطع کرده به پزشک مراجعه کنید.

۸- در موارد نادر در صورت بروز علائم آنفلوآنزا بعد از خوردن دارو یا بروز راش پوستی با پزشک مشورت کنید.

۹- در هنگام تجویز این دارو برای بیماری که از نظر مصرف سدیم محدودیت دارند ، میزان سدیم قرص دیکلوفناک سدیم باید مدنظر قرار گیرد.

۱۰- از خوردن و شستن این دارو خودداری کنید.

**عوارض جانبی :**

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای بشود ، گر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز هر کدام از

آنها با پزشک خود مشورت کنید.