

مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

اطلاعات محدودی در خصوص مصرف هیوسین در دوران بارداری و شیردهی موجود می باشد؛ لذا مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمیگردد.

عوارض جانبی :

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته شود، اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید.

واکنش های پوستی(از جمله کهیر، خارش، قرمزی و راش)، شوک آنافیلاکتیک، تنگی نفس، تاکیکاردی، احتباس ادراری و خشکی دهان.

عوارض جدی در اثر مصرف دوز بالای این دارو مشاهده نشده است. با مصرف دوز بالای این دارو ممکن است عوارضی همچون احتباس ادراری، خشکی دهان، قرمزی پوست، تاکیکاردی، کاهش حرکات دستگاه گوارش و مشکلات بینایی، ایجاد گردد. در صورت شدید بودن این عوارض بیمار را به بیمارستان منتقل نمایید.

مقدار و نحوه مصرف دارو :

میزان مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند؛ لذا دوز معمول دارو به صورت زیر می باشد:

- بزرگسالان: دو قرص چهار بار در روز
- در سندروم روده تحریک پذیر، دوز اولیه یک قرص سه بار در روز می باشد که می تواند در صورت لزوم تا دو قرص، چهار بار در روز مصرف شود.
- کودکان ۶ تا ۱۲ سال: یک قرص سه بار در روز
- مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۶ سال توصیه نمی شود.
- دارو را به صورت کامل و همراه با یک لیوان آب مصرف کنید.
- دارو به صورت چند روز متوالی یا برای زمان طولانی بدون مشخص شدن علت درد شکم مصرف نگردد.

موارد منع مصرف :

- ❖ در بیماران دارای میاستنی گراو، مگاکلون، گلوکوم با زاویه بسته، تنگی مکانیکی دستگاه گوارش ، انسداد یا فلج ایلئوم.
- ❖ در صورت حساسیت به هیوسین- ان- بوتیل بروماید

دارو را دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کرده و از یخ زدگی محافظت نمایید.

بسته بندی :

شرکت داروسازی رها قرص هیوسین- ان- بوتیل بروماید ۱۰ میلی گرم را به صورت بلیستر درون جعبه و به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.

Hyoscine-N-Butyl Bromide 10

هیوسین - ان - بوتیل بروماید ۱۰

قرص روکشدار

دسته دارویی : ضد اسپاسم گوارشی- ضد دیسمنوره- ضد اسپاسم ادراری

موارد مصرف و آثار درمانی :

کاهش اسپاسم گوارشی و اسپاسم دستگاه ادراری تناسلی، سندروم روده تحریک پذیر یا IBS، ترشحات بیش از حد دستگاه تنفسی، کولیک روده.

هشدارها :

- ❖ افزایش فشار چشم ممکن است با استفاده از داروهای آنتی کولینرژیک از جمله هیوسین در بیماران که گلوکوم زاویه بسته آنها قبلاً تشخیص داده نشده است، رخ دهد. لذا در صورت پیشرفت درد، قرمزی چشم و یا کاهش بینایی بعد از تزریق این دارو، بیمار فوراً تحت نظر چشم پزشک قرار گیرد.
- ❖ این دارو در صورت تاکیکاردی (در موارد تیروتوکسیکوز، نارسائی قلبی، جراحی قلبی) با احتیاط مصرف گردد.
- ❖ به دلیل خطر عوارض آنتی کولینرژیک، مصرف در موارد مشکوک به انسداد روده یا انسداد مجاری ادراری، با احتیاط انجام گردد.
- ❖ به دلیل اینکه داروهای آنتی کولینرژیک تعریق را کاهش می دهند، این دارو در موارد همراه با تب، با احتیاط تجویز گردد.
- ❖ در صورت دردهای شدید و پیشرونده یا دردهای همراه با علائمی همچون تب، تهوع، استفراغ، تغییر در حرکات روده، حساسیت به لمس شکمی، کاهش فشار خون، غش و خون در مدفوع، تست های تشخیصی مناسب در جهت تشخیص علت باید انجام گردد.
- ❖ در صورت وجود موارد ذیل قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمائید:

- سن بالای ۴۰ سال

- وجود خون در مدفوع، استفراغ، بی اشتها یا کاهش وزن، خستگی، یبوست شدید، تب، خونریزی شدید واژینال و درد در هنگام دفع ادرار
- ❖ در صورت بدتر شدن علائم یا ایجاد علائم جدید و عدم بهبود آنها پس از ۲ هفته از شروع درمان، حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.
- ❖ این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی و تاری دید گردد؛ لذا در حین درمان با این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری و دقت کامل دارند، خودداری نمائید.
- ❖ این قرص حاوی لاکتوز بوده و در بیماران دارای نقص عدم تحمل لاکتوز، مصرف نگردد.

تداخلات دارویی :

- ❖ اثرات آنتی کولینرژیک داروهای چون ضد اسهال های سه حلقه ای و چهار حلقه ای، آنتی هیستامین ها، کینیدین، آمانتادین، آنتی سایکوتیک ها (مثل فنوتیازین ها، دیزوپیرامید، تیوتروپیوم، اپیراتروپیوم و ترکیبات شبه آتروپین، ممکن است با مصرف هیوسین افزایش یابد. تاکیکاردی در اثر داروهای بتا آدرنرژیک ممکن است توسط هیوسین افزایش یابد.
- درمان همزمان با آنتاگونیست های دوپامین همچون متوکلوپرامید، ممکن است باعث کاهش اثر هر دو دارو بر روی دستگاه گوارش گردد.