

#### ت ( عوارض جانبی):

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشد. در صورت بروز هر یک از عوارض زیر سریع با پزشک خود تماس بگیرید:

شیوع بیشتر: آنفولانزا، عفونت تنفسی

شیوع نادر: التهاب ممانه، تورم کبد، تشنج

سایر عوارض جانبی نیاز زیادی به توجه پزشکی ندارد و در طی دوره درمان رفع می شوند، با این وجود در صورت ادامه هر کدام از این عوارض با پزشک خود مشورت کنید:

شیوع بیشتر: افزایش وزن

شیوع نادر: درد شکمی، تحریک سیستم عصبی مرکزی، گیجی، خشکی دهان، خون دماغ، افزایش اشتها، مشکلات پوستی، اشکال در بخواب رفتن، تورم پلک چشم

#### ج ( مسمومیت دارویی):

در صورت مصرف بیش از حد دارو بیمار را سریعاً به بیمارستان منتقل کنید.

#### چ ( شرایط نگهداری دارو):

❖ دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

❖ دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

#### ح ( بسته بندی):

شرکت داروسازی رها کتوتیفن را به صورت قرص در بلیستر، درون جعبه به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه می کند.

هر قرص حاوی ۱ میلی گرم کتوتیفن (به صورت فومارات) می باشد.

# کتوتیفن<sup>®</sup> ۱

## کتوتیفن<sup>®</sup> ۱

شکل دارویی: قرص ۱ میلی گرمی

دسته دارویی: آنتی هیستامین، آنتی آسماتیک

موارد مصرف و آثار درمانی:

درمان آلرژی از جمله رینیت، کونژکتیویت، پیشگیری آسم

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

#### الف ( راهنمایی های عمومی):

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

۱- در صورت سابقه حساسیت به دارو، هر نوع غذا و یا هر نوع ماده افزودنی

۲- در صورت مصرف هر نوع دارو

۳- در صورت ابتلا به دیابت ملیتوس یا صرع

#### ب ( مصرف در دوران بارداری و شیر دهی):

مطالعه این دارو برای انسان انجام نگرفته است، لذا مصرف این دارو در بارداری و شیردهی جایز نیست.

#### پ ( هشدارها):

۱- این دارو نباید با داروهای ضد دیابت خوراکی، الکل، آنتی هیستامین ها، خواب آورها و آرامبخش ها استفاده شود.

۲- این دارو در حملات آسم استفاده نمیشود و فقط برای پیشگیری موثر است.

۳- این دارو را فقط با نظر پزشک مصرف کنید.

۴- اگر یک دوز از دارو را فراموش کردید به محض به یادآوردن مصرف کنید، اما اگر به زمان مصرف دوز بعد رسیده است دوز درمانی را دو برابر نکنید.

۵- از آنجائی که بدنبال مصرف این دارو خواب آلودگی و گیجی ممکن است اتفاق بیافتد از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارد مانند رانندگی خودداری کنید.

۶- گاهی به علت تحریک سیستم عصبی مرکزی، هیجان زدگی و بی خوابی بخصوص در کودکان دیده می شود.

#### ت ( مقدار و نحوه مصرف دارو):

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می نماید، با این وجود مقدار مصرف معمول دارو به صورت زیر می باشد:

افراد بزرگسال و کودکان بالای ۳ سال: یک قرص دو بار در روز (صبح و عصر).