

ث (مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای بیماران مختلف، متفاوت است. مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین میکند. دوز معمول استفاده از این دارو ۵ تا ۱۵ میلیگرم هر ۴ تا ۶ ساعت بسته به شدت درد میباشد. تعیین دوز در کودکان با توجه به سن و وزن توسط پزشک متخصص تعیین میگردد.

ج (مسمومیت دارو:

در صورت مسمومیت بیمار را سریعاً به بیمارستان منتقل کنید.

چ (شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد در ظروف در بسته و محکم نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

ح (بسته بندی:

شرکت داروسازی رها قرص اکسی کدون هیدروکلراید را در دوزهای ۵ و ۱۵ میلی گرمی به همراه بروشور درون جعبه، بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.

Oxydon®

Oxycodone Hydrochloride

اکسیدون®

اکسی کدون هیدروکلراید

ترکیبات: اکسی کدون هیدروکلراید

شکل دارویی: قرص ۵ و ۱۵ میلی گرم

دسته درمانی: آنالژژیک، آگونیست اپیوئید

اثر درمانی: تسکین دردهای متوسط تا شدید

الف (راهنمایهای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید:

- ۱- در صورت سابقه حساسیت به این دارو.
- ۲- در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر از جمله تضعیف کننده های سیستم اعصاب مرکزی، الکل، مهارکننده های مونوآمین اکسیداز، تالترکسون، ریفامپین، زیدوودین.
- ۳- در صورت ابتلا به فلج ایلئوس (پارالیتیک ایلئوس)، آسم، هایپرکریبیا، دپرسیون تنفسی، بیماری مجاری صفراوی، پانکراتیت حاد و متوسط، کاهش حجم خون، شوک سرکولاتوری (به دلیل افت شدید فشار خون)، اسهال بدلیل کولیت سودوممبران، اسهال بدلیل مسمومیت نباید از این دارو مصرف شود.
- ۴- در صورت ابتلا به بیماری آدیسون، آرتی قلی، سابقه تشنج، سابقه مصرف الکل، سنگ صفراوی، ضربه مغزی یا جراحات وارد شده به مغز، نارسایی کبدی، هیپوتیروئید، IBD بیماری التهابی روده ای بدلیل ریسک مگاکولون، هایپرتروفی پروستات، جراحی دستگاه ادراری تناسلی بدلیل ریسک احتباس دارو، میک ادم، نارسایی کلیوی و بیماری مزمن تنفسی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید تا میزان ریسک به سود را سنجش و برای شما این دارو را با دوز مناسب تجویز نمایند.

ب (مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

اپیوئیدها در طبقه بندی C از FDA قرار دارند. اگرچه در مورد اکسی کدون اثرات ترانوتونیک در انسان گزارش نشده و مطالعه ای در این زمینه انجام نگردیده است. اکسی کدون در شیر ترشح میشود و باعث دپرسیون تنفسی در نوزاد میگردد، بنابراین نایبستی در دوران شیردهی از این دارو مصرف گردد.

پ (هشدارها:

مصرف دراز مدت این دارو باعث وابستگی فیزیکی و نه وابستگی روانی میگردد.
مصرف این دارو باعث کاهش ترشح بزاق و احتمال ایجاد پوسیدگی بیشتر در دهان میگردد.
افراد حامله و شیرده از این دارو استفاده ننمایند.

ت (عوارض جانبی:

وابستگی فیزیکی، خواب آلودگی، سرگیجه، سردرد، یبوست، تهوع، استفراغ، خارش و اگزما، احتباس ادرار، خشکی دهان، تنگی نفس، لرزش، اضطراب و کاهش اشتها از عوارض شایع این دارو میباشند.
در صورت مشاهده اسهال شدید، بدن درد مفرط، تپش قلب شدید، تب، آبریزش بینی، تعریق بیش از حد، بیقراری، کرامپ شکمی، ضعف جسمانی شدید و گشادی مردمک به پزشک یا داروساز سریعاً اطلاع دهید.