

Atenolol

آتنولول

شکل دارویی: قرص روکشدار ۵۰ میلی گرمی و ۱۰۰ میلی گرمی

دسته دارویی: بتا بلاکر

موارد مصرف و آثار درمانی: کاهش فشار خون

این دارو برای بیماری شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

الف) راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- ❖ در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده رنگی یا ماده محافظ
- ❖ در صورت ابتلا به بیماری‌هایی نظیر: دیابت، پرکاری تیروئید، آسم، میاستنی گراو، افسردگی، نارسایی کلیوی، اسیدوز متابولیک، شوک کاردیوژنیک، افت فشار خون، اختلالات عروقی، برادی کاردی سینوسی و نارسایی قلبی
- ❖ در صورت مصرف هرگونه دارو از جمله گلی بن کلامید، انسولین، داروهای مهارکننده کانال کلسیمی (دیلتiazم)، کلونیدین، دیازوکساید، سمپاتومیمتیک‌ها مانند سودوافدرین، داروهای ضد انعقاد، آلکالوئیدهای ارگو، کینیدین، داروهای ضد بارداری خوراکی، NSAIDs، املاح آلومینیوم، املاح کلسیم، کلسترآمین

ب) مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

⚠ این دارو به هیچ وجه بدون صلاحیت پزشک مصرف نشود.

پ) هشدارها:

- ❖ دارو را به صورت یک بار در روز و در یک زمان ثابت استفاده کنید.
- ❖ پیش از هر نوبت مصرف دارو سرعت ضربان قلب را کنترل کنید. اگر تعداد ضربان قلب در هر دقیقه کمتر از ۶۰ ضربه باشد، مصرف دارو را قطع کنید و به پزشک اطلاع دهید.
- ❖ قطع ناگهانی دارو باعث تشدید علائم آئزین صدی یا بروز سکت قلبی خواهد شد. دارو را به تدریج و طی ۲ هفته قطع کنید.
- ❖ بیشترین اثر کاهشده فشار خون آتنولول یک تا دو هفته پس از آغاز درمان مشاهده خواهد شد.
- ❖ بروز عوارضی مانند کندی ضربان قلب، سرگیجه، افسردگی، بثورات پوستی، تب، گلو درد، خونریزی غیر عادی یا کبودی را به پزشک اطلاع دهید.
- ❖ هنگام انجام فعالیت‌هایی که نیاز به هوشیاری دارند احتیاط کنید.
- ❖ قبل از انجام جراحی، پزشک خود را از مصرف آتنولول مطلع نمایید.
- ❖ در صورت بروز بارداری به پزشک اطلاع دهید.
- ❖ این دارو ممکن است سبب ترمیوسیتونی و آگرانولوسیتوز شود.
- ❖ آتنولول ممکن است علائم هیپوگلیسمی را پنهان نماید، بنابراین در بیماران دیابتی با احتیاط مصرف شود.
- ❖ آتنولول ممکن است باعث افزایش غلظت تری گلیسیرید، کلسترول تام ، LDL ، VLDL و کاهش غلظت HDL شود.

ت) عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته شود. اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید:

برادی کاردی (کاهش ضربان قلب)، افت فشار خون، نارسایی قلبی، تنگی نفس، افسردگی، خستگی، ضعف، ناتوانی جنسی، اضطراب، تهوع، استفراغ، خستگی چشم‌ها، بی نظمی ضربان قلب، درد قفسه سینه، سر درد، کوتاهی نفس، لرزش، تعریق.

ث) مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند.

ج) مسمومیت دارویی:

در صورت بروز مسمومیت، بیمار را وادار به استفراغ کرده و هرچه سریع تر به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

چ) شرایط نگهداری دارو:

- ❖ دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- ❖ دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

ح) بسته بندی:

شرکت داروسازی رها آتنولول را به صورت قرص در دو دوز متفاوت ۱۰۰ و ۵۰ میلی گرم در پلیستر و درون جعبه ، به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه می کند.