

## ت ( مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند.

## ث (عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای نیز شود، اگر چه در اغلب بیماران عارضه چندانی بروز نکرده و یا عوارض جزئی با ادامه درمان بر طرف می شود، لذا در صورت بروز بعضی از عوارض و ادامه یا تشدید آنها با پزشک مشورت کنید.

## عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند:

نادر: میالژی، میوزیت، رابدومیولیز ( تب، درد یا گرفتگی عضلاتی، ضعف)، شوک آنافیلاکسی

## عوارضی که در صورت تداوم یا ادامه یافتن نیاز به توجه پزشکی دارند:

شایع: بیضت، اسهال، سوزش سردل، درد معده، سرگیجه، سردرد، تهوع، راش پوستی، نازوفارنژیت، واکنش های حساسیتی، هایپرگلاسمی

نادر: بی خوابی، ناتوانی جنسی ، ترومبوسیتوپنی، هایپوگلاسمی، افزایش وزن، بی اشتها، کایوس، اختلال در چشایی، بی حسی، فراموشی، نوروپاتی محیطی، دوبینی، اختلال در بینایی، وز وز گوش، از دست دادن شنوایی، خونریزی از بینی، درد فارینگولارینژال، پانکراتیت، هیاتیت، نارسایی کبدی، کلستاز، ضعف و بی حالی ، درد قفسه سینه، ادم محیطی ، سندرم شبه لوپوس، سندرم استیونس جانسون، نکرورتوکسیک اپیدرمال، ژنکوماستی، تاندونیت، پارگی عضله، درد گردن، ریزش مو.

## ج (مسمومیت دارویی :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد تعیین شده و در صورتی که مدت زیادی از خوردن دارو نگذشته باشد، بیمار را وادار به استفراغ نموده و سریعاً به بیمارستان منتقل نمایید.

## چ (شرایط نگهداری دارو :

❖ دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

❖ دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

## ح (بسته بندی :

شرکت داروسازی رها قرص آتورواستاتین ۱۰ را به صورت بلیستر، درون جعبه و به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.

هر قرص حاوی ۱۰ میلی گرم آتورواستاتین (بصورت کلسیم تری هیدرات) می باشد.

# Atorvastatin 10

## آتورواستاتین ۱۰

## شکل دارویی : قرص روکشدار

**دسته دارویی :** مهار کننده آنزیم HMG.CO.A Reductase، آنتی هایپرلیپیدمی (پائین آورنده چربی خون)

## موارد مصرف و آثار درمانی :

هایپرلیپیدمی (پائین آورنده کلسترول تام، LDL-C، آپولیپو پروتئین B، تری گلیسرید)، پیشگیری از بیماری های عروق کرونر قلب، کاهش خطر سکنه قلبی، مغزی و آنژین.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

## الف ( راهنمایی های عمومی :

❖ قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

۱- در صورت سابقه حساسیت به این دارو و یا داروهائی مانند لوواستاتین ، سیمواستاتین، فلوواستاتین، پراواستاتین و همچنین حساسیت به هر نوع غذا، ماده محافظ، ماده رنگی.

۲- در صورت مصرف همزمان داروهایی از قبیل سیکلوسپورین، جم فیبروزیل ، فیبرات ها، نیاسین، داروهای ضد بارداری ، دیگوکسین ، گریپ فروت، نفازودون، وراپامیل.

۳- در صورت وجود سابقه پیوند اعضا و مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و جراحی یا آسیب های جدی و ابتلا به بیماری های نارسایی کلیوی «عفونت حاد ، اختلالات الکترولیتی و متابولیکی شدید، افت فشار خون، صرع کنترل نشده و نارسایی کبدی.

## ب ( مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :

این دارو در دوران بارداری و شیر دهی منع مصرف دارد.

## پ ( هشدارها :

۱- این دارو برای کنترل هایپرلیپیدمی مصرف می شود. دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید.

۲- در صورت فراموش کردن مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید مگر اینکه زمان مصرف دوز بعدی نزدیک باشد. از دو برابر کردن مقدار مصرف دارو خودداری کنید.

۳- از مصرف آتورواستاتین با آب گریپ فروت خودداری کنید.

۴- در صورت مشکوک بودن به بارداری به پزشک اطلاع دهید.

۵- قبل از قطع مصرف دارو با پزشک مشورت کنید.

۶- در صورت هر نوع جراحی ( از جمله جراحی های دندان ) یا درمانهای اورژانسی به پزشک اطلاع دهید.

۷- توصیه می شود بیمار در طول درمان از نظر کلسترول ، کراتین کیناز، تستهای کبدی و ترانس آمیناز تحت مراقبت قرار گیرد.

توصیه می شود بیمار در طول درمان از نظر کلسترول ، کراتین کیناز ، ترانس آمیناز، تستهای کبدی تحت مراقبت قرار بگیرد.