

ت) مقدار و نحوه مصرف دارو:

ث) عوارض جانبی:

یک دارو به موزات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای نیز بشود. اگر که در اغلب بیماران عارضه چناندی بروز نکرده و یا عوارض جزئی با ادامه درمان و تطبیق بدن با دارو بر طرف می شود، معندها در صورت بروز بعضی از عوارض و ادامه با تشیدد آنها با پرسش مشورت کنید.

شایع ترین عوارض: سرد درد، سرگیجه، ادم محيطی، تهوع، بیوست، گرگرفتگی
مهمنترین عوارض: بی ظاهری ضربان قلب، کند شدن ضربان قلب، نارسایی قلبی، بلوك AV
عوارض نادر: خواب الودگی، بی خوابی، ضعف، اختلالات روانی، پارسنتزی، وزوز کردن گوش، افت فشار خون، اختلال در هدایت قلبی، وضعیت غیر طبیعی ECG، سکوپ، درماتیت، کهیر و خارش، حساسیت به نور، اسهال، دل پیچه، استغفار، خشکی دهان.

ج) مسومیت: در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد تعیین شده و در صورتیکه مدت زیادی از خوردن دارو نگذشته باشد، بیمار را وادار به استفراغ نموده و سریعاً به بیمارستان مسمومیت منقل نمائید.

چ) شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
دارو را از دسترس اطفال دور نگهدارید.

ج) بسته بندی:

مشکت داروسازی رها دلیتیازم هیدروکلراید را به صورت قرص روکشدار، در جعبه به همراه بروشور عرضه می کند. هر قرص حاوی ۶۰ میلی گرم دلیتیازم هیدروکلراید می باشد.

+۹۸(۰)۳۱-۳۶۵۴۰۸۵۹ تلفن: ۰۶۵۹-۵۶۷-۸۱۷۸۵ مددکاری پستی: ۰۶۵۹-۵۶۷-۸۱۷۸۵
+۹۸(۰)۳۱-۳۶۵۴۰۸۵۹ فکس: www.raahapharm.com

Diltiazem 60

دیلپیازم ۶۰

شکل دارویی: قرص روکشدار

دسته دارویی : بلوک کننده کانال کلسیمی
آثار درمانی : پایین آورنده فشار خون، درمان آرثیزین صدری و آریتمی

الف) راهنمایی‌های عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

۱. در صورت سایقه حساسیت به این دارو یا داروهای مانند نیندیقپین، روامیسل و هچنین حساسیت به نوع خاص ماده محافظ و ماده رنگی
۲. در صورت مصرف همراه داروهای از قبیل آمیدوارون، دیگوکسین، اتولول، بروپرالول، استازولایدم، داروهای ضد افسردگی، داروهای مدر، کاربامازین، کاربامازین،

۳. در صورت ابتلا به بیماریهای کبدی، کلیوی، اختلالات قلبی از قبیل نارسایی قلبی، بلوک قلبی، احتقان ریوی.

ب) مصرف در دوران پاردادی و شیر دهی :

این دارو در دوران پاره داری و شیر دهی فقط با نظر پزشک متخصص مصرف گردد.

- دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید و در دوره درمان بطور منظم تحت نظر پزشک قرار گیرید.
- در موقع مصرف در صورتیکه تعداد ضربان قلب در یک دقیقه به کمتر از ۵۰ ضربان رسید به پزشک اخلاط دهد.
- با شروع درمان ممکن است سر درد عارض گردد. معمولاً ادامه درمان این عارضه از بین می‌رود.
- در مورد میزان فالاتیلتهای بدین خود با پزشک مشورت کنید.
- قبیل از مصرف دارو یا کاهش مقدار آن حتماً به پزشک مراجعه کنید. زیرا ممکن است کاهش تدریجی مقدار مصرف دارو نیاز باشد.

- ۷- برای بدحافل رساندن ادم، مصرف میانجیات و نمک را محدود کنید.
 - ۸- از این داروهای خاص که از آنها به عنوان میانجیات در ترکیب داروهای دیگر استفاده شود، باید خود را محدود کرد.

۱۰- در صورت برخوبی نظریه پریمیتیوی قاب، کوتاه شدن نفسها، تورم دستها و پاها، سرگیجه شدید، یبوست، تهوع یا پایین بودن فشارخون فوراً بپوشک تماس

۹- این دارو افراد مسن و افراد مبتلا به نارسایی قلبی، کبدی و کلیوی با اختیارات تجویز گردید.

۸- دارو را در صورتی که انسان بعده از بروکت مضرور شود و در طبع و تعییر مقدار آن مواداری میبیند.

۱۱- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن مقدار فراموش شده را مصرف کنید و لی اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، آن امض فر کند و مقدار مصرف بعده را این به این نوکسید.

— 1 —