

**ت ) عوارض جانبی:**  
این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشد.  
خواب آلودگی، سرگیجه، احساس سبکی در سر، اختلالات بینایی (دوینی)، افت فشار خون و بی خوابی، ورم، درد عضلانی یا مفصلی، منگی، تکر ادرار، عفونت ادرار، سوء ظن، تهوع، توهمندی خصوصاً در افراد مسن، تب، پنومونی، درد قفسه سینه، بلع دردنگ، فراموشی.

**ث ) مقدار و نحوه مصرف دارو:**

❖ مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند.

❖ به منظور کاهش عوارض جانبی دارو و پیشگیری از افت فشار خون وضعیتی شروع درمان از زیر حد دوز درمانی شروع میشود و سپس دوز دارو به تدریج در طی چند روز افزایش یابد.

❖ این دارو را کمتر یا بیشتر از دور تعیین شده مصرف نکنید.

❖ کودکان: اینمی و کارانی این دارو در کودکان زیر ۱۲ سال ثابت نشده است.

❖ این دارو در ۳ دوز متقسم مصرف می گردد.

**ج ) مسمومیت دارویی :**

فوراً بیمار را به بیمارستان منتقل کنید.

**ج ) شرایط نگهداری دارو:**

دارو را دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

**د ) بسته بندی:**

شرکت داروسازی رها پرامی پکسول را بنام تجاری پارکیسول ۰/۷٪ به شکل قرص بصورت بلیستر درون جعبه به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه میکند.  
هر قرص پارکیسول ۰/۷٪ حاوی ۰/۰ میلی گرم پرامی پکسول و ۰/۱ میلی گرم کلراید می باشد.

# Parkisol® 0.7 Pramipexole

## پارکیسول® ۰/۷٪ پرامی پکسول

**شكل دارویی:** قرص خط دار

**دسته دارویی:** آکونیست دوپامین (ضد دیسکینزی)

**موارد مصرف و آثار درمانی:**

پارکینسون، سندروم پای بی قرار

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

**(الف) راهنمایی های عمومی :**

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سبقه حساسیت به این دارو

- در صورت مصرف هر نوع دارو خصوصاً:

- ترکیبات لوروپوا و کربی دوبا

- سایمپتیدین

- انتاگونیست دوپامین مانند هالوپریدول، متوكلورامید، فنوتاپریزین و تیوگرانتینها

- داروهایی که دفع کلیوی دارند مانند دیلتیازم، کینیدین، کینین، رانیدین، و رامیل، تریامترن.

- در صورت ابتلاء بیمارهای کلیوی (نارسائی کلیه)، بیمارهای دزتراتیو شیکیه چشم، عوارض فیبروتیک ناشی از داروهای دوپامینزیک.

**(ب) مصرف در دوران بارداری و شیردهی :**

این دارو در گروه C از طبقه بندی FDA قرار دارد. مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی بایستی در موارد اضطراری و با تشخیص پزشک انجام شود.

**(ب) هشدارها :**

- جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو حتماً به پزشک خود مراجعه کنید.

- مصرف این دارو ممکن است سبب سرگیجه، مشکلات بینایی، ضعف، احساس سبکی سر و عدم هماهنگی در ماهیچه ها شود، لذا رانندگی و کارهایی که نیاز به هوشیاری و دقت کافی دارند خودداری کنید.

- مصرف این دارو به بیماریهای کلیوی هستند، باحتیاط صورت گیرد.

- اینمی و کارانی این دارو در کودکان ثابت نشده است. لذا نباید در گروه سینی زیر ۱۲ سال مصرف شود.

- در صورتیکه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض بیاد آوردن در صورتیکه نزدیک مصرف دوز بعدی نباشد آن را میل کرده و از دو برابر کردن مقدار مصرف خودداری کنید.