

ت) مقدار و نحوه مصرف دارو:
بزرگسالان: یک تا دو قرص هر شب
مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال توصیه نمی شود.

ج) عوارض جانبی:

این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند:

حساسیت، خشکی دهان، یبوست، تحریک سیستم اعصاب مرکزی در بیماران حساس از جمله هیجان، عصبی شدن، بی قراری، سرگیجه، ضعف یا بی خوابی اختلالات خونی و کبدی

چ) مسمومیت دارویی:

در صورت مسمومیت بیمار را سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

ح) شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

خ) بسته بندی:

شرکت داروسازی رها ترکیب استامینوفن / فنیل افرین هیدروکلراید / دیفن هیدرامین هیدروکلراید

را با نام تجاری رهامون® و به صورت قرصهای گرد دو رنگ، یک لایه سبز و یک لایه سفید در جعبه به همراه بروشور عرضه میکند.

هر قرص حاوی ۵۰۰ میلی گرم استامینوفن، ۵ میلی گرم فنیل افرین هیدروکلراید و ۲۵ میلی گرم دیفن هیدرامین هیدروکلراید میباشد.

Rahamoon®

رهامون®

ترکیبات: استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم / فنیل افرین هیدروکلراید ۵ میلی گرم / دیفن هیدرامین هیدروکلراید ۲۵ میلی گرم

شکل دارویی: قرص خط دار

دسته دارویی: ضد تب، ضد درد، ضد احتقان، آنتی هیستامین

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

الف) موارد مصرف و آثار درمانی:

درمان سرماخوردگی و سینوزیت

ب) راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- ۱- در صورت سابقه حساسیت به هر یک از مواد موثره دارو شامل استامینوفن و فنیل افرین، دیفن هیدرامین و یا هر نوع ماده افزودنی.
- ۲- در صورت ابتلا به بیماریهای ویروسی کبدی، الکلیسم، بیماریهای قلبی، گلوکوم، افزایش فشارخون.
- ۳- در صورت مصرف داروهای آنتی کولینرژیک از جمله هیوسین و اتروپین، الکل، ضد افسردگیهای سه حلقه ای.
- ۴- داروهای مهار کننده آنزیم مونو آمینواکسیداز از جمله ترانزیتل سیپرومین و داروهای آمینی سمپاتومیمتیک، سایر فرآورده های حاوی استامینوفن

پ) مصرف در دوران بارداری و شیر دهی:

هنگام بارداری تنها با تجویز پزشک مصرف شود. در زمان شیردهی منع مصرف دارد.

ت) هشدارها:

- ۱- دارو را بیش از مقدار توصیه شده مصرف نکنید.
- ۲- مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال توصیه نمی شود.
- ۳- در مصرف همزمان با سایر فرآورده های حاوی استامینوفن احتیاط کنید.
- ۴- این دارو باعث گیجی و خواب آلودگی می شود لذا از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری کرده و بهتر است این دارو را شب، هنگام خواب مصرف کنید.
- ۵- از مصرف این دارو با ترکیبات الکلی خودداری کنید.
- ۶- در صورت فراموش کردن یک نوبت دارو به محض به یادآوردن آن را مصرف کنید، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی رسیده باشد آن را مصرف نکرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.