

Raquit® 100

Quetiapine

راکوئیت ۱۰۰ کوئتیاپین

ترکیبات : کوئتیاپین (بصورت فومارات) ۱۰۰ میلیگرم

شکل دارویی : قرص روکشدار

دسته درمانی : ضد جنون و سایکوز ، اثرات آنتی سایکوتیک توسط بلوک رسپتور های سروتونین و دوپامین در CNS

اثر درمانی : برای درمان نشانه های اختلال جنونی (سایکوتیک) مانند اختلال اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی و همچنین برای درمان شرایط عصبی ، عاطفی و روانی مثل اسکیزوفرنی به تنهایی یا همراه با داروهای دیگر مصرف میگردد.

(الف) راهنمایهای عمومی :

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است ؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید :

- * در صورت سابقه حساسیت به این دارو
- * در صورت داشتن یا سابقه بیماری قلبی عروقی، سکنه، مشکلات کبد و پروستات، فشار خون پایین ، بیماری های تنفسی ، تشنج ، دیابت ، پارکینسون ، گلوکوم ، میاستنی گراو، پرفان ، بیماریهای خونی ، انعقادی و فئوکروموسایتوما .
- * در صورت کهولت سن و داشتن زوال عقل (دمانس) .
- * در صورت مصرف هر نوع داروی دیگر.
- * در صورت احساس تب ، درد و گرفتگی ماهیچه ، عرق ، سطح پایین هوشیاری ، حرکات غیر قابل کنترل صورت و زبان ، سرگیجه و احساس خواب آلودگی شدید ، تشنج و یا تعویض دردناک و طولانی سریعاً به پزشک مراجعه کنید.
- * در صورت احساس تب همراه علائم شبیه آنفلوآنزا.
- * در صورت بیوست همراه با درد شکمی .

(ب) مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

جزء گروه C است و ممکن است به جبین آسیب برساند. در صورت شک به بارداری یا برنامه ریزی برای آن پزشک خود را مطلع سازید. اطلاعاتی برای اثبات آسیب رسانی به کودک شیرخوار و دفع این دارو در شیر وجود ندارد ، برای جلوگیری از آسیب احتمالی حتماً با پزشک خود مشورت نمایید.

(پ) هشدارها :

- * جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو حتماً به پزشک خود مراجعه کنید.دارو را بیشتر یا کمتر از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف ننمایید و از قطع خودسرانه مصرف دارو خودداری کنید. به منظور بررسی پیشرفت درمان به طور منظم به پزشک مراجعه کنید.
- * مصرف این دارو در بیماران پایین تر از ۱۸ سال ممنوع است.
- * این دارو با داروهای زیر تداخل دارد ، از مصرف همزمان اجتناب کنید و حتماً به پزشک خود اطلاع دهید: داروهای ضد فشار خون ، سایمتیدین ، کلاریترومایسین ، پیلنیتازم ، اریترومایسین ، فلوکونازول ، ایتراکونازول ، کتوکونازول ، نفازودون ، وراپامیل ، لوودوپا ، لورازپام و تیوریدازین، داروهای ضد ایدز و داروهای ضد افسردگی ، باربیتورات ، دیورتیک و داروهایی که باعث بیوست میشوند.
- * اگر شما نشانه های افسردگی و یا افکار خودکشی را در چندین هفته اول درمان دارید حتماً به پزشک خود اطلاع دهید. هرگز خودسرانه دوز داروی خود را تغییر ندهید و یا بطور ناگهانی قطع نکنید؛ همچنین بیماران باید در طی مصرف دارو از لحاظ هیپرگلیسمی مانیتور شوند. همچنین تغییرات رفتاری همچون تحریک پذیری در نظر گرفته شود.
- * از مصرف نوشیدنیهای الکلی دار اجتناب شود.
- * این دارو ممکن است باعث افزایش وزن شود.
- * خطر دیس کینزی تاخیری با این داروها وجود دارد.
- * جهت کاهش خشکی دهان، یخ ، آب نبات بدون شکر و آدامس بدون شکر استفاده کرده و آب زیاد بنوشید.
- * این دارو باعث خواب آلودگی ، سرگیجه و ضریان نامنظم میشود، لذا در طول درمان با این دارو از رانندگی و کار با ابزاری که نیاز به تمرکز دارند اجتناب کنید.

(ت) عوارض جانبی:

* این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود ، گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتند ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند.

* عوارض بالقوه این دارو شامل : اختلال در تکلم ، تنگی نفس ، علائم پارکینسون اکستراپیرامیدال ، علائم سرماخوردگی ، گالاکتوره ، لوکوپنی، افت فشار وضعیتی ، ادم محیطی ، راش پوستی،هیپوترئیدی ، افت فشار خون ، تغییرات قاعدگی ، سندرم نورولپتیک بدخیم ، تشنج و تائیکاردی میباش.

* عوارض جانبی دیگر این دارو شامل بی خوابی، سرگیجه، خشکی دهان، بی‌بوست، خستگی و ضعف و غش، گرفتگی بینی، خارش و افزایش آنزیم های کبدی می باشد . افزایش وزن در طی مراحل اولیه درمان دیده میشود، هیپرگلیسمی و سندرم نورولپتیک با این دارو نادر است، دیس کینزی تاخیری در درمان طولانی مدت گزارش شده است . سنکوپ، افزایش فواصل QT و نوتروپنی گزارش شده است؛ سایر عوارض جانبی شامل اضطراب، تب، میالژی، رینیت، دیس پپسی و افزایش سطح چربی خون است؛ گزارش نادر از صرع ، واکنش های افزایش حساسیت، شامل آنژیوادم ، پریاپیسم و ادم محیطی و عوارض چشمی شامل آب مروارید و تغییرات در لنز های چشمی در مصرف طولانی مدت مشاهده شده است.

(ث) مقدار و نحوه مصرف دارو:

* مقدار مصرف دارو برای بیماران مختلف، متفاوت است. مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین میکند.

میتوانید این دارو را بدون غذا میل نمایید ؛ یک ساعت قبل از غذا یا قبل از خوابیدن قرص را بخورید. به هیچ وجه همراه با این دارو و یا در طول درمان آب گریپ فروت ننوشید.

* حتی اگر احساس بهبودی داشتید ؛ بدون صلاحدید پزشک مصرف دارو را قطع ننمایید.

* در صورتیکه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض بیدار آوردن در صورتیکه نزدیک مصرف دوز بعدی نباشد آن را میل کرده و از دو برابر کردن مقدار مصرف خودداری کنید؛ در صورتیکه کل روز را فراموش کردید ، طبق برنامه ، روز بعد مصرف دارو را ادامه دهید، در صورتیکه یک هفته دارو را مصرف نکردید، برای ادامه درمان حتماً به پزشک مراجعه کنید.

(ج) مسمومیت دارو :

اگر شما فکر می کنید بیش از مقدار تجویز شده این دارو را مصرف کرده اید، فوراً به بیمارستان مراجعه کنید. خواب آلودگی شدید ، ضریان قلب سریع، احساس سبکی سر و غش از نشانه های مصرف دوزهای بیش از اندازه است.

(چ) شرایط نگهداری دارو :

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، در ظروف در بسته و محکم نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی :

شرکت داروسازی رها کوئتیاپین را با نام تجاری راکوئیت® و به شکل قرص روکشدار ۱۰۰ میلیگرمی به صورت پلیسترو درون جعبه ، به همراه بروشور بسته بندی و عرضه میکند.