

اسموپیون®

Bupropion hydrochloride

بوپروپیون هیدروکلراید

شکل دارویی: قرص پیوسته رهش ۱۵۰ میلی گرم

دسته درمانی: ضدافسردگی، داروی غیرنیکوتینی ترک سیگار

اثر درمانی: افسردگی، افسردگی مازور، درمان کوتاه مدت ۶ تا ۱۲ ماهه یا بلندمدت افسردگی، ترک سیگار.

الف) راهنماییهای عمومی:

قبل از مصرف این مکمل در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید:

۱- در صورت سابقه حساسیت به این دارو

۲- در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر به ویژه فورازولیدون، پروکاربازین، سلزیلین، ریتوناویر، ضدافسردگیها، لوودوپا، کلوزاپین، کورتیکواستروئیدها هالوپریدول، لیتیم، لوکساین، مایروتیلین، مولیندون، فنوتیازین، تیوفیلین، تیوزانتین، ترازودون، دسیپرامین، ایپی پرامین، سرتالین، نورتریپتیلین، بتابلوکرها، ضد آریتمی های نوع IC، انسولین، داروهای کاهنده اشتها، فنوباریتال، فنی توفین، کاربامازپین، سیکلوفسفامید، ارفنادرین، سایمتیدین، الکل و داروهای حاوی الکل

۳- در صورت ابتلا به تشنج، صرع، پرخوری عصبی (bulimia)، بی اشتهاپی عصبی (anorexia nervosa)

۴- افرادی که ناراحتی قلبی، کلیوی، کبدی و یا سابقه مشکلات روحی، روانی، اختلال دو قطبی، افکار و تمایل به خودکشی و یا سابقه اعتیاد به کوکائین، تریاک و مواد مخدر دیگر دارند.

ب) مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

بوپروپیون در گروه B قرار دارد و از جفت عبور میکند. بدلیل تجمع این دارو در شیر و احتمال ایجاد تشنج در نوزادان، در خانم های شیرده توصیه می شود در دوران مصرف دارو، شیردهی انجام نگیرد.

پ) هشدارها:

❌ در سنین زیر ۱۸ سال استفاده نشود.

❌ این دارو را زیر نظر پزشک و دقیقاً طبق دستورالعمل، مصرف نمایید.

❌ از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند، خودداری شود.

❌ امکان بروز واکنش های حساسیت به نور در حین مصرف دارو وجود دارد، بهتر است از محافظت کننده های پوست (کرم ضد آفتاب) و چشم (عینک آفتابی) استفاده شود.

❌ دوره درمان در ترک سیگار ۷ تا ۱۲ هفته است.

❌ از شکستن، جویدن و یا خرد کردن قرص پیوسته رهش بوپروپیون خودداری شود. در صورت نیاز به دوز پایین تر بایستی از دیگر شکل های دارویی بوپروپیون با دوز ۷۵ یا ۱۰۰ میلیگرم استفاده کرد.

❌ دارو بایستی سر ساعت معین مصرف شود.

❌ در دوره درمان ترک سیگار، بیمار میتواند سیگار بکشد اما این کار باعث کاهش شانس ترک سیگار میشود.

❌ در دوره درمان ترک سیگار، مصرف این دارو همراه با پیچ پلاستیکی نیکوتین برای ترک سیگار، فقط با نظارت پزشک امکان پذیر است، زیرا احتمال افزایش فشار خون وجود دارد.

ت) عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند.

شایعترین عوارض: اُزیتاسیون(هیجان و آشفتگی) و اضطراب.

عوارض کمتر شایع: سردرد، راش پوستی، تب، خارش، وزوز گوش.

عوارض نادر: غش، اثرات نوروسایکیاتریک مثل گیجی، توهم، هذیان، پارانوئی، تشنج، اختلال در تمرکز، اکاتیزی (اختلال حرکت)، سرخوشی، اختلال خواب لرزش، سنکوپ، آرامش بیش از حد.

ث) مقدار و نحوه مصرف دارو:

❌ مقدار مصرف دارو برای بیماران مختلف، متفاوت است و مقدار مصرف را پزشک تعیین می نماید.

❌ دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.

❌ برای اینکه مصرف دارو فراموش نشود سعی کنید دارو را در ساعت های مشخص مصرف کنید.

❌ در صورت فراموش کردن یک دوز دارو، به محض به یادآوردن آن را مصرف کنید، مگر اینکه نوبت بعدی مصرف دارو نزدیک باشد. در این صورت از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری نمایید.

❌ از جویدن، خردکردن و نصف کردن این قرص اجتناب کرده و آن را کامل بلعید.

ج) مسمومیت دارویی:

در صورت مسمومیت فوراً بیمار را به بیمارستان منتقل کنید. علائم مسمومیت عبارتند از: توهم دیداری و شنیداری، عدم هوشیاری، تهوع، تشنج، تاکی کاردی و استفراغ.

چ) شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

ح) بسته بندی:

شرکت داروسازی رها اسموپیون® پیوسته رهش ۱۵۰ را به صورت قرص، در بلیستر و درون جعبه، به همراه بروشور به بازار عرضه می نماید.