Timolin® 0.5 % | تیمولین® ۰/۵ درصد

Timolol | تیمولول

ترکیبات : تیمولول (به صورت مالئات) ۰/۵ درصد

شکل دارویی : قطره استریل چشمی

دسته دارویی : بتا بلاکر

مورد مصرف : درمان افزایش فشار چشم و گلوکوم زاویه باز

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایی‌های عمومی :

در صورت حساسیت به دارو یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده دارو، پزشک خود را مطلع کنید.

لنزهای تماسی حتما باید قبل از مصرف قطره از چشم خارج شود و حداقل پس از ۱۵ دقیقه داخل چشم قرار گیرد.

هنگام مصرف از تماس نوک قطره چکان با چشم یا هر سطح دیگر خودداری نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :

مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی با صلاحدید پزشک صورت گیرد.(گروه **C**)

هشدارها :

این دارو در مبتلایان به بیماری آسم یا سابقه ابتلا به آن، بیماری انسدادی مزمن و شدید ریه، نارسایی قلب، شوک با منشاء قلبی، بلوک دهلیزی - بطنی درجه ۱ و ۳ کنترل نشده توسط پیس میکر، اختلالات عروقی محیطی مانند سندرم رینود ، برادی کاردی سینوسی منع مصرف دارد.

دارو را بیش از مقدار تعیین شده مصرف نکنید.

قبل از انجام هرگونه بیهوشی و بی حسی ، پزشک را از مصرف این دارو مطلع کنید.

این دارو در بیماران قلبی- عروقی و بیماران دچار هایپوگلایسمی و دیابت باید با احتیاط مصرف گردد.

به علت احتمال ایجاد خشکی چشم توسط این دارو ، در بیمارانی که دچار بیماری های قرنیه هستند با احتیاط مصرف شود.

استفاده هم زمان این دارو با سایر بتابلاکرها (حتی موضعی) توصیه نمی شود.

مقدار مصرف دارو :

مقدار مصرف دارو توسط پزشک و براساس شرایط بیمار تعیین می گردد.

بزرگسالان و کودکان بالای ۱۰ سال: یک قطره یک یا دو بار در روز در چشم چکانده شود.

نحوه مصرف دارو :

- سر را به طرف عقب نگه داشته، سپس با یک دست پلک پایینی را به طرف پایین کشیده و در حالیکه به طرف بالا نگاه می کنید با دست دیگر قطره را به داخل پلک چشم بچکانید. سپس چشم را به اطراف گرداند تا قطره در تمام سطح چشم پراکنده شود.

- از تماس نوک قطره چکان با محل و آلودگی آن خودداری کنید. از ریختن قطره بطور مستقیم بر روی مردمک و قرنیه خودداری کنید..



عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است در بعضی افراد موجب بروز برخی عوارض ناخواسته گردد . اگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند، ولی در صورت بروز هر یک از آنها بهتر است با پزشک مشورت شود.

● عوارض بینایی: کاهش اشک، تاری دید، تحریک و التهاب و درد خفیف چشم، التهاب قرنیه ، دوبینی ، حساسیت به نور، التهاب پلک و اختلالات بینایی، خشکی چشم

● به علت جذب کم سیستمیک ، ممکن است شاهد عوارض دیگری نیز باشیم مانند: قلبی – عروقی ، تنفسی ، پوستی ، متابولیک ، گوارشی ، سیستم عضلانی ، شوک آنافیلاکسی ، علائم آلرژی و اختلالات جنسی.

تداخلات دارویی :

مصرف همزمان تیمولول با داروهای بلاک کننده کانال کلسیمی ، بلاک کننده های گیرنده آدرنرژیک ، داروهای آنتی آریتمی (شامل آمیودارون) ، گلیکوزیدهای دیجیتال ،پاراسمپاتومیمتیک ها و گوانتیدین احتمال افت فشار خون و برادی کاردی را افزایش می دهد.

مصرف همزمان با مهار کننده های آنزیم CYP2D6 (مانند : کینیدین ، فلوکستین و پاروکستین) احتمال بلاک سیستمیک گیرنده های بتا را افزایش می دهد.

مصرف همزمان با سایر بتابلاکرهای چشمی و اپی نفرین باعث ایجاد میدریاز می گردد.

مصرف همزمان با داروهای کلونیدین ، داروهای بی حسی و بیهوشی، سایمتیدین ، هیدرالازین ، فنوتیازین و الکل تداخل دارد.

شرایط نگهداری دارو :

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید.
- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.
- یک ماه پس از باز کردن درپوش ظرف از مصرف آن خودداری کنید.

بسته بندی :

شرکت داروسازی رها قطره چشمی تیمولین® را در ظروف پلی اتیلنی بسته بندی و به بازار عرضه می نماید. هر قطره چشمی ۵ میلی لیتری حاوی ۰/۵ درصد تیمولول (بصورت مالئات) می باشد.