



شرکت داروسازی رها
RAHA Pharmaceutical Co.

افزایش پلک زدن یا اسپاسم در پلکها، درد مفاصل، تهوع، راش، تشنج، گلودرد، آبریزش بینی، التهاب مفاصل، گرفتگی سینه، چشمان یا پوست زرد شده، استفراغ خونی.

عوارض نادر: انجام عمل هایی که از کنترل فرد خارج است، خرخر در خواب، درد گوش، درد قفسه سینه، عدم کنترل پاهای، از دست دادن انرژی و قدرت، از دست دادن شنوایی، ضربان نامنظم، تعریق بیش از حد، تغییر صدا، صحبت کردن در خواب، لرزش پاهای، بازوها و دستها، آکاتیزی، سکوک، افزایش میل جنسی، در صورت داشتن مداوم حالات زیر به پزشک مراجعه کنید: تهوع، استفراغ بی اشتیاهی عصبی، پوست سرگیجه، خشکی دهان، تعریق بیش از حد، التهاب حلق و گلو، درد ماهیجه ای، کاهش وزن، اختلال در خواب و لرزش.

ث) مقدار و نحوه مصرف دارو:

- پیش از شروع به مصرف دارو، بروشور داخل جعبه را به دقت مطالعه فرمایید.
- مقدار مصرف دارو برای بیماران مختلف، متفاوت است.
- دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.
- برای اینکه مصرف دارو فراموش نشود سعی کنید دارو را در ساعت های مشخص مصرف کنید.
- در صورت فراموش کردن یک دوز دارو، به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید مگر اینکه نوبت بعدی مصرف دارو نزدیک باشد. در این صورت از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری ننمایید.

ج) مسمومیت دارویی:

در صورت مسمومیت فوراً بیمار را به بیمارستان منتقل کنید. علامت مسمومیت عبارتند از: توهمندی و شنیداری، عدم هوشیاری، تهوع، تشنج، تاکی کاردی و استفراغ.

ج) شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید. شرکت داروسازی رها آلبرازولام ۰/۵ میلیگرم را به صورت قرص، به شکل بلیستر و یا ظروف پلی اتیلنی، به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.

ح) بسته بندی:

شرکت داروسازی رها آلبرازولام ۰/۵ میلیگرم را به صورت قرص، به شکل بلیستر و یا ظروف پلی اتیلنی، به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه می نماید. این دارو را بسته بندی زیر نظر پزشک بصورت احتیاطی در نوزاد و از دست دادن وزن نوزاد، در خانم های شیرده توصیه می شود شیردهی انجام نگردد و یا این دارو مصرف نشود.

شکل دارویی: قرص ۵/۰ میلی گرم

دسته دارویی: ضدخاطرات، آرام یخن، خواب آور

اثر درمانی: اضطراب، اختلالات اضطرابی و علائم اضطرابی گذرا، فشار عصبی، اختلال پانیک، ترس از جمعیت و مکانهای باز، حملات ترس، سندرم رفتار پیش از قاعده، درمان کمکی در سایکوز مقاوم به درمان، بیماری تووه (Tourette Syndrome)

(الف) راهنماییهای عمومی: قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید :

۱- در صورت سایقه حساسیت به این دارو

۲- در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر بویژه داروهای ضدافسردگی، آنتی هیستامین، سداتیو، آنتی سایکوتیک، داروهای حاوی الکل، داروهای بی حسّی و بیهوشی عمومی مسکن های ایمودینیک، دکسترومیتوفان، داروهای حاوی بروپوکسی芬، نالوکسون، بوبرپورفین، کلوزابین، ایندیناپیر، فنتالین، دروپریدول، فلوكوبازول، ایترکوبازول، کنکوبازول، لوومتادیل استات، پوساکوبازول، دلاوبریدین، ووریکوبازول و سدیم اکسی بات.

۳- افرادی که تاراخطی کلیوی، کبدی و یا ساقیه بیماریهای ریوی و گلوکوم حاد زایده بسته دیگر دارند.

ب) مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

آلبرازولام در گروه D فرار دارد و از تجویز و مصرف آن در دوران حاملکی باستی احتیاط گردد و در صورت مصرف باستی نوزاد را از نظر علایم ترک دارو تحت نظر داشت. بدليل تجمع این دارو در شیر ایجاد مشکل در شیرخواری در نوزاد و از دست دادن وزن نوزاد، در خانم های شیرده توصیه می شود شیردهی انجام نگردد و یا این دارو مصرف نشود.

ب) هشدارها :

در سنین زیر ۱۸ سال استفاده نشود.

ابن دارو را زیر نظر پزشک و طبق دستورالعمل، مصرف ننمایید.

ابن دارو ممکن است باعث خواب آلودگی گردد. لذا ضمن درمان، از رانندگی و کار با سایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری گردد.

سبیگار باعث افزایش متابولیسم و کاهش اثر دارو میشود، در دوره مصرف این دارو سبیگار کشیدن منوع میباشد.

از مصرف الکل و نوشیدنیهای حاوی الکل یا شربت های دارویی الکل دار احتیاط شود.

ابن دارو باستی زیر نظر پزشک بصورت تدریجی قطع گردد.

عوارض دارویی در ابتدای دوره درمان بیشتر است و بصورت تدریجی تحمل ایجاد میشود؛ این مشکلات را به پزشک خود اطلاع دهید تا در صورت نیاز دوز تنظیم گردد.

ابن قرص حاوی لاکتوز مونوهیدرات میباشد؛ در صورت حساسیت به لاکتوز از خودن این قرص احتیاط کنید یا قبل از مصرف از لاکتاز استفاده ننمایید و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت) عوارض جانبی: هر دارویی به موارز ارات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشد.

عوارض نسبتاً شایع: اختلال حافظه، مشکلات تکلمی، بیقراری، تحریک پذیری، افسردگی، ناامیدی، خواب آلودگی، از دست دادن اشتها، احساس سبکی در سر، خستگی و ضعف غیر معمول.

عوارض کمتر شایع: درد در ناحیه شکم، تاری دید، مدفوع برنگ خاک رس و گلی، عدم شناخت مکان و زمان و اشخاص، کاهش حجم ادرار، اسهال، سختی تنفس، مشکلات حرکتی، مشکلات تمیز کار، ادرار تیره زنگ، سرگیجه و خشکی دهان، سردی، تب و احساس داغی، ترس و عصبی بودن، غش، اختناق گوششها.

TAB.LFT.APNO.5/017.02

اصفهان، کلیووتر ۷ جاده شیراز شهرک مستعد صفحه، واحد ۱، صندوق پستی: ۵۴۹-۳۶۵۴-۰۵۹ تلفن: ۰۹۸(۰)۱-۳۶۵۴-۰۵۹
www.rahabpharm.com

2

اصفهان، کلیووتر ۷ جاده شیراز شهرک مستعد صفحه، واحد ۱، صندوق پستی: ۵۴۹-۳۶۵۴-۰۵۹ تلفن: ۰۹۸(۰)۱-۳۶۵۴-۰۵۹
www.rahabpharm.com

1